


AVC et Diabète




Dr de la Hamette Hôpital Kirchberg Luxembourg

Le Diabète, une épidémie mondiale

Number of people with diabetes by IDF Region, 2013




Prävalenz von Typ 1 Diabetes bei Kindern bis 15 Jahren in ausgewählten Ländern in den Jahren 2010 und 2011 (je 100.000 Einwohner)




le Diabète

Affection métabolique caractérisée par la présence d'une hyperglycémie chronique résultant d'une déficience de sécrétion d'insuline, d'anomalies de l'action de l'insuline ou de l'association des deux.


complications du diabète




Relative Steigerung des Hirninfarkt-Risikos



Causes de l'AVC



Vorhofflimmern:
Abnormal schnelle
und chaotische
Erregungen mit
Ursprung in den
Vorhöfen



Vorhofflimmern im EKG



plus fréquentes dans le diabète

Facteur de mauvais pronostic: l'hyperglycémie

dans 50% des AVC : hyperglycémie en phase aigue

50% diabète connu ou non connu

50% hyperglycémie passagère sans diabète

augmentation de la morbi-mortalité surtout pour patients non diabétiques

Source d'erreur: l'hypoglycémie

L'AVC du patient diabétique

Plus fréquent

Plus de jeunes

Plus de femmes

Plus de séquelles

Plus de démences

Plus de récurrences

Plus de décès

Traitement de l'AVC du patient diabétique

Thrombolyse:

plus de complications, moins de bénéfice

Insuline:

bénéfice sous condition d'éviter les hypoglycémies

prévention de l'AVC du patient diabétique = prise en charge multifactorielle



Combattre:

Hypertension, Tabac, Dyslipidémie, Microalbuminurie, Surcharge pondérale, Sédentarité

et

le déséquilibre glycémique

Merci pour votre attention